

دستورالعمل دان مورد نیاز جوجه

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش پسماندها نیاز به دان مطلوب برای تغذیه می باشد، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای این امر پیشنهاد می گردد.

هدف: ارائه راهکارهای اجرایی برای استفاده از دان مطلوب برای تغذیه دان

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با مدیران مرغداری ها می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه مرغداری ها لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- دان مورد مصرف جوجه ها، باید پلیت شود(به اندازه مناسب برای سن جوجه ها).
- باید همیشه از دان تازه برای تغذیه جوجه ها ، در سالن پرورش ، استفاده کرد.
- دان باید هفته ای یکبار به مجتمع های پرورش طیور ، تحویل گردد.
- سیلوهای مخصوص ذخیره سازی دان ، در مجتمع های پرورش طیور ، باید به اندازه مصرف یک هفته طیور مورد پرورش ، به اضافه مقدار مصرف به اندازه ۲ روز ، به طور ذخیره برای تغذیه طیور را ، همواره داشته باشند.
- سیلوهای مخصوص ذخیره سازی دان در مجتمع های پرورش طیور ، باید در خارج از سالن پرورش نصب شده باشند، تا تانکرهای ویژه حمل دان ، وارد سالن پرورش نشود.

- در مدت ۶ هفته اول زندگی جوجه ها در سالن پرورش ، لازم است که دان ، در تمام اوقات شبانه روز ، در اختیار جوجه ها ، قرار داشته باشد.

- در مدت چند روز اول زندگی جوجه ها در سالن پرورش ، باید دان به آسانی در دسترس جوجه ها باشد.

- باید توجه نمود و مراقبت کرد، که کل جوجه ها ، در سالن پرورش ، دان بخورند . برای تحقق این امر ، باید نور به اندازه لازم و کافی ، بر روی دان خوری ها ، وجود داشته باشد، تا جوجه ها به آسانی بتوانند ، دان را بیابند و مصرف کنند.

هم چنین باید دمای سالن پرورش به اندازه لازم و کافی باشد، تا جوجه ها در سالن پرورش به طور متراکم (به ویژه در زیر ماشین مادر مصنوعی)، تجمع نکنند و شرایط دمای محیطی سالن به گونه ای باشد، که جوجه ها بتوانند به راحتی ، دان مصرف کنند.

- دان خوری ها را در سالن پرورش ، باید در خارج از لبه چتر ماشین مادر مصنوعی قرارداد ، تا نور لازم و کافی به دان خوری ها برسد و دان موجود در دان خوری ها، نیز خشک نگردد.

- در روز اول زندگی جوجه ها ، در سالن پرورش ، چند ساعت پس از آغاز مصرف کردن دان ، باید چینه دان جوجه ها بزرگ و پر از دان باشد.

- باید جوجه هائی را که در سالن پرورش ترسو به نظر می رسند، با دقت لازم مورد بازرسی و کنترل قرار داد، و اطمینان حاصل کرد. که چینه دان اینگونه جوجه ها پر باشد (خوب تغذیه کرده باشند).

- باید دان خوری های مورد نیاز جوجه ها را در سالن پرورش ، به اندازه لازم و کافی، در سالن پخش کرد و چید.

- میزان دان خوری های مورد نیاز طیور در سالن پرورش ، در دوران رشد ، باید بر اساس نیاز طیور به دان خوری ، در زمان رسیدن به سن بلوغ آن ها در نظر گرفته شود، و بر این مبنا محاسبه گردد.

- چنانچه جوجه ها ، پیش از رسیدن به سن بلوغ از سالن پرورش به سالن تولید، منتقل شوند، میزان دان خوری های مورد نیاز جوجه ها در سالن پرورش ، کمتر خواهد بود.

- مرغدارانی که در سالن پرورش ، در دوران رشد ، از برنامه محدودیت غذایی برای طیور در حال رشد پیروی می نمایند، جهت تحقق این برنامه ،در سالن پرورش نیاز به دان خوری های بیشتری خواهند داشت ، زیرا باید در روزی که دان جهت تغذیه در اختیار جوجه ها قرار داده می شود، همگی جوجه ها در سالن ، در یک لحظه و به گونه هم زمان ،آغاز به تغذیه و مصرف دان نمایند.

- چنانچه میزان دان خوری ،در سالن پرورش ، در دوران رشد، به اندازه لازم و کافی موجود نباشد، گله مرغ تخمگذار ، در زمان رسیدن به سن بلوغ ، رشد بدنی یکنواخت و هم سان نخواهند داشت. زیرا طیور سرزنده و شاداب و مهاجم ، همواره بیشتر از طیور ترسو و کسل، از دان تغذیه کرده و آن را مورد مصرف قرار می دهند.

- ارتفاع دان خوری ، در سالن پرورش ، در دوران رشد ، باید به گونه ای باشد و تنظیم شود، که کف دان خوری ، هم سطح پشت طیور باشد.

- چنانچه ارتفاع دان خوری کمتر از اندازه تعیین و نوشته شده در بالا باشد، موجب می شود، که طیور زنده ، دان بیشتری را در اثر عمل نوک زدن به دان ،به هدر دهند.

- برای تنظیم کردن ارتفاع دان خوری، در سالن پرورش ، در دوران رشد ، می توان از پایه های قابل تنظیم و یا زنجیرهای نوع آویزی و یا کابل های سیمی مناسب ، بهره گیری کرد.

- باید توجه داشت ، که در سالن پرورش ، در دوران رشد ، طیور زنده دوست ندارند برنامه عادی زندگی شان، در هر دوره زندگی، تغییر کند. بنابراین باید دقت کرد ، که نسبت به هر وسیله جدید که در سالن پرورش، مورد بهره گیری طیور قرار می گیرد، طیور به آن ها عادت نمایند.